

常见问题

我在植入导管药盒前是否能进食和喝水？

建议你在安置中央静脉导管前，食物的份量减少，不要吃得太饱。

我在植入导管药盒后是否需要住院？

由于植入过程只需局部麻醉，因此不必住院。

我能淋浴和游泳吗？

导管药盒是埋在皮肤底层，因此你可以照常淋浴。待表皮上的伤口完全愈合后，就可以游泳。

我能做运动吗？

被植入导管药盒者都不宜做剧烈的健身运动，例如：打网球和高尔夫球。剧烈动作可能会导致连接药盒的导管松脱或偏离最佳位置。

我能去旅行吗？

若计划到国外旅行，请事先征询医生的意见。一般上在国内或出国度假是允许的。

我如何知道我的植入式导管药盒是否有问题？

植入导管药盒可能会引发并发症。若你出现以下现象或症状，请联系你的医生或护士：

- 导管药盒埋入点周围出现红肿、疼痛和脓液
- 皮肤出现红疹或水疱
- 导管药盒埋入点有不寻常的疼痛
- 高烧、发冷 / 发抖和冒汗（受感染的症状）
- 导管药盒植切入口无法愈合。

联系我们

若有任何疑问，请在办公时间联系中央静脉导管护理护士。

电话 : 8218 1516
星期一至星期五 : 上午8时至下午5时
星期六 : 上午8时至中午12时
星期日 / 公定假日 : 休息

声明

国立癌症中心并不推荐或推广本册子中提到的任何产品。本册子的内容以概要形式提供，只作一般资讯用途，读者不宜据此自行处理健康问题或取代就医，更不可因读了其中的内容，就忽视医生的建议或延迟求医。

2014年6月首版。2017年本版。


新加坡国立癌症中心版权所有©

保留所有权利。未经出版者事先书面批准，本册内容一概不得复制、存储于检索系统，或以电子、机械、复印、录制或任何其他形式或途径传播。

文档编号: NUR-EDU-PEM-010/0317



植入式导管药盒须知




什么是植入式导管药盒？

植入式导管药盒是埋在皮肤下的一个碟状物。常见的埋入点是在胸口上方，锁骨之下。

为什么需要植入式导管药盒？

你的医生将为以下原因建议你植入导管药盒：

- 注射化疗药物
- 长期注射抗生素
- 输血或血液制品的注入
- 静脉营养治疗



导管药盒是如何被植入体内的？

植入手术是在局部麻醉下进行，植入口可以在胸口的左或右侧。

医生会在皮肤上做一个小切口，把药盒植入后连接通往心脏上方大静脉的导管。


最后会以胸腔X光扫描来确认药盒植入的位置。

植入导管药盒有哪些风险？

植入导管药盒和大多数外科手术一样可能会有失血或受感染的风险。植入导管药盒的其他风险包括：

- 导管错位或偏离最佳位置
- 误穿肺部
- 误穿动脉，导致出血

如何护理植入式导管药盒？



- 导管药盒每次使用后必须冲洗。
- 在没有使用的情况下，导管药盒必须由受过训练的人员，每个月定期冲洗。
- 导管药盒是埋入皮肤底层的，因此在皮肤切口愈合后不需要放敷料。

完成治疗后，如何将导管药盒取出？

完成治疗后导管药盒无需取出。但是，必须每一个月定期冲洗。